


ПАНДЕМИЧЕСКИЙ ГРИПП КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**ИДТИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ СЛЕДУЕТ ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ У ВАС НАБЛЮДАЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ СИМПТОМОВ:**



Затруднение дыхания



Боль в груди



Сильный озноб



Посинение губ и кожных
покровов



Частые случаи рвоты
или диареи

Слабость по утрам

**Спутанность
сознания
(больной не узнает
членов семьи
или друзей)**

Младенца в возрасте до 2 мес, который отказывается от еды, следует немедленно показать врачу.

Если в вашей местности существует риск заражения малярией, при повышении температуры следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Подготовлено AED
9 сентября 2009 г.



Если случаи мочеиспускания у больного происходят редко или моча темного цвета, возможно, у него обезвоживание организма. Такому больному необходимо обильное питье.

Если у больного наблюдается обезвоживание организма, дайте ему раствор для пероральной регидратации, следуя инструкции на упаковке, или очищенную воду.



Если ваш ребенок находится на грудном вскармливании, можете продолжать кормление.

**ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА ДО ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ.**



Внимательно слушайте сообщения от высшего руководства вашей страны или министерства здравоохранения о ситуации в своем регионе и следуйте их инструкциям.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Подготовлено AED
9 сентября 2009 г.